



克林霉素磷酸酯注射液

Clindamycin Phosphate Injection

2ml:0.3g/4ml:0.6g



医保甲类

2ml:0.3g 国药准字H20057388
4ml:0.6g 国药准字H20057389

深部感染的理想用药

对革兰阳性菌、厌氧菌具有高度抗菌活性
穿透力强，可在组织和血液中广泛分布

骨科、妇产科抗感染效果显著
无需皮试，使用更方便



克林霉素磷酸酯注射液

Clindamycin Phosphate Injection

2ml:0.3g/4ml:0.6g

临床应用 治疗革兰阳性菌、厌氧菌引起的下列感染

- 下呼吸道感染：包括厌氧菌、金黄色葡萄球菌、肺炎链球菌、其它链球菌（粪肠球菌除外）及金黄色葡萄球菌引起的肺炎、脓胸、肺脓疡。
- 皮肤及软组织感染：化脓性链球菌、金黄色葡萄球菌、厌氧菌引起的皮肤和皮肤软组织感染。
- 妇科感染：包括子宫内膜炎、非淋菌性输卵管卵巢脓肿、盆腔蜂窝组织炎、术后阴道切口感染。
- 腹腔感染：敏感厌氧菌引起的腹腔内感染，包括腹膜炎和腹内脓肿。
- 血液感染：金黄色葡萄球菌、链球菌（除肠球菌）、敏感厌氧菌引起的败血症。
- 骨和关节感染：金黄色葡萄球菌引起的包括急性血源性骨髓炎在内的骨和关节感染，作为敏感微生物引起的慢性骨和关节感染的手术治疗的辅助治疗。

简明处方资料

【药品名称】 通用名称：克林霉素磷酸酯注射液

【性 状】 本品为无色至微黄色的澄明液体。

【适 应 症】 克林霉素磷酸酯注射液适用于由敏感厌氧菌引起的严重感染。

克林霉素磷酸酯注射液适用于由链球菌、肺炎球菌和葡萄球菌等敏感菌株引起的严重感染，但仅适用于对青霉素过敏的患者或经医生判断不宜使用青霉素的患者。鉴于抗生素有引起伪膜性结肠炎的风险（见说明书黑框警告），在选择克林霉素前，医生应考虑感染的性质和有无毒性较低的替代药（如红霉素）。应当开展细菌学研究以证明致病病原体以及它们对克林霉素的敏感程度。在实施抗生素疗法的同时，可根据临床情况采取外科治疗。适应症详情见药品说明书。

【用法用量】 治疗期间发生明显腹泻，应停用本品。

本品可静脉滴注给药，也可肌肉注射给药。肌肉注射不需稀释，直接使用，单次给药剂量建议不超过600mg。静脉滴注须将本品每0.3g用50-100ml生理盐水或5%葡萄糖稀释成≤6mg/ml浓度的药液，缓慢滴注，通常每分钟不超过20mg。

1、成人，剂量如下：

中度感染：每日0.6~1.2g，分2、3、4等剂量，每12、8、6小时一次。

严重感染：每日1.2~2.7g，分2、3、4等剂量，每12、8、6小时一次，或遵医嘱。

2、儿童，剂量如下：

中度感染：每日15~25mg/kg，分3或4等剂量，8或6小时一次。

重度感染：每日25~40mg/kg，分3或4等剂量，8或6小时一次。或遵医嘱。

【禁 忌】 1.本品与林可霉素、克林霉素有交叉耐药性，对克林霉素或林可霉素有过敏史者禁用。

2.本品含苯甲醇，禁止用于儿童肌肉注射。

3.由于克林霉素不扩散到脑脊液中，本品不能用于脑膜炎治疗。

【规 格】 按 $C_{18}H_{33}ClN_2O_5S$ 计，2ml:0.3g、4ml:0.6g

【贮 藏】 避光，密闭，在阴凉处保存。

【有 效 期】 18个月

【批准文号】 2ml:0.3g 国药准字H20057388

4ml:0.6g 国药准字H20057389

【生产企业】 江西赣南海欣药业股份有限公司



武汉九州钰民医药科技有限公司

电 话：027-62438189

网 址：<http://www.whjzym.com>

地 址：湖北省武汉市武昌区中北路86号万达汉街总部国际D座1208室

了解更多，欢迎扫码关注

内部资料，仅供医药专业人士使用和阅读